

第2類医薬品

漢方製剤 **小青竜湯エキス[顆粒]A**

小青竜湯エキス[顆粒]Aは、漢方の古典「傷寒論」に収載されている漢方処方です。

このように方

- うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出る方の感冒、アレルギー性鼻炎、花粉症に
- うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出る方の気管支炎や気管支ぜんそくに

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称       | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能又は効果】

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

### 【用法及び用量】

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

| 年 齢        | 1回量   | 1日服用回数 |
|------------|-------|--------|
| 成人(15歳以上)  | 1 包   | 3回     |
| 15歳未満 7歳以上 | 2/3 包 |        |
| 7歳未満 4歳以上  | 1/2 包 |        |
| 4歳未満 2歳以上  | 1/3 包 |        |
| 2歳未満       | 1/4 包 |        |

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 【成分及び分量】

本品3包(4.5g)中、下記の生薬より抽出した小青竜湯エキス(1/2量)2250mgを含有します。

|        |      |         |      |
|--------|------|---------|------|
| 日局ハンゲ  | 3.0g | 日局サイシン  | 1.5g |
| 日局マオウ  | 1.5g | 日局シャクヤク | 1.5g |
| 日局カンゾウ | 1.5g | 日局ケイヒ   | 1.5g |
| 日局ゴモシ  | 1.5g | 日局カンキョウ | 1.5g |

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、ℓ-メントール、結晶セルロース、D-マンニトールを含有する。

### 【成分に関連する注意】

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



本品についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

御所薬舗株式会社 お客様相談室  
住 所：〒639-2200 奈良県御所市1207番地  
電 話：0745(62)3388  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで(土・日・祝日を除く)

製造販売元

**御所薬舗株式会社**

奈良県御所市1207番地